


ジオトリブ®を 服用される方へのお知らせ

ジオトリブ®は1日1回、毎日同じ時間の空腹時に服用

- ジオトリブ®は、1日1回、毎日同じ時間の**空腹時(食前の1時間以内、食後の3時間以内を避けて)**に、コップ1杯の水やぬるま湯で服用してください。



食事は避けてください

● 飲み忘れた場合など



前回の服用時間を覚えていないなど、わからないことがある場合には、すぐに担当医、看護師、もしくは薬剤師に連絡してください。間違っ
て飲んだとき、多く飲みすぎてしまったかもしれないときにも連絡してください。

- ① 服用時間に近い場合(8時間以内)は、服用せずに、次の決められた時間に定められた用量を服用してください。
- ② 次の服用時間まで8時間以上ある場合、空腹時の条件(前の食事から3時間以上経過し、次の食事まで1時間以上時間があること)を満たすことができれば、服用することができます。

● 薬剤保管上の注意

本剤は湿気と光に不安定なため、服用直前に開封し、開封後には湿気と光を避けて保存してください。

注意すべき
症状は
裏面参照▶

このような症状に注意しましょう!

●次のような症状がみられたら、すぐに担当医に連絡しましょう!

間質性肺疾患	<ul style="list-style-type: none">・階段をのぼったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる・空咳(からせき)がでる・発熱がある
下痢	<ul style="list-style-type: none">・激しい下痢がある・頻回の下痢を認める
皮膚症状	<ul style="list-style-type: none">・高熱(38℃以上)・皮膚の広い範囲が赤くなる・目の充血、めやに(眼分泌物)、まぶたの腫れ、目が開けづらい
肝障害	<ul style="list-style-type: none">・倦怠感・尿の色が濃くなる・皮膚や白目が黄色くなる
心障害	<ul style="list-style-type: none">・呼吸困難や動悸があらわれる・疲れを感じる・足のむくみがあらわれる
消化管の出血	<ul style="list-style-type: none">・胃の痛み、みぞおちの痛みがある・便が黒い・血を吐いた
脾臓の異常	<ul style="list-style-type: none">・急に激しく腰や背中が痛む・急に激しくお腹が痛む・吐き気、嘔吐・発熱がある
眼の異常	<ul style="list-style-type: none">・眼の痛み、腫れ、発赤・ジオトリフ服用中のかすみ目や視覚の変化

●次のような症状がみられたら、受診時に担当医にお知らせください。

爪の(まわりの)異常	<ul style="list-style-type: none">・爪のまわりの皮膚が赤く腫れる・痛みがある
口内炎	<ul style="list-style-type: none">・口のなかの痛み、出血、熱いものや冷たいものがしみる・口の乾燥、口のなか赤くなったり腫れたりする・口が動かしにくい・ものが飲みこみにくい・味が変わる

施設名